

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

LUE VENEREA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
LUE VENEREA.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

GULIELMUS HARRISON,
BRITANNUS,

Societatum Physicæ et Chirurgo-Medicæ Soc. Hon.

Sperate miseri, cavete felices.

Ad diem 12. Septembris, hora locoque folitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXI.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

Viro Illustrissimo

BELINGHAM GRAHAM,

BARONETTO,

De patria, cognatis, amicis,

Optime merenti,

Hanc Dissertationem Inauguralem

Ea, qua par est,

Observantia,

D. D. Cq.

A U C T O R.

HEC pestis gravissima, quæ nihil ali-
 o seculo ab humano generi ulque societas
 aut exitio vel mortibus intulit ira divina,
 anno 1493, Hispaniæ incolæ primum coepit
 interficere, a Columbo sociisque ejus ex In-
 dia Occidentali, recens repperit, ad Europam
 interficere apportata. Altero aphine anno
 Italiam attingit, namque stragem apud
 milites Gallicos, quæ Carolo octavo ducis
 Neapolim occupabant, horrendam edidit,
 et ab illis domum reversis in omnem Galliam
 brevi sunt diffusa. Adeo celeriter progressa
 est.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

LUE VENEREA.

HÆC pestis gravissima, qua nihil ullo
seculo ab initio rerum usque foedius
aut exitiosius mortalibus intulit ira divina,
anno 1493, Hispaniae incolas primum coepit
infectare, a Columbo fociisque ejus ex In-
dia Occidentali, recens reperta, ad Europam
infeliciter apportata. Altero abhinc anno
Italiam attigerat; namque stragem apud
milites Gallicos, qui, Carolo octavo duce,
Neapolim occupaverant, horrendam edidit,
et ab iis domum reversis in omnem Galliam
brevis fuit diffusa. Adeo celeriter progressa
† A est,

est, ut intra quadriennium, postquam in Hispania se ostenderat, universas fere Europae regiones peragraverit, tot hominum modum in miserandum millia rapiens, ut genus humanum extinctura esse videretur. Signa ejus formidolosissima, progressumque rapidum et funestum, ipsa medicina, unde mortales morbis gravioribus ante colluctantes vel auxilium acceperant vel speraverant, conspexit attonita, seque tanto malo occurrere non posse devicta, plane confessa est.

Ita cohortem morborum, quae Europae ante incubuerat, magis numerosam reddendo, et hanc orbis terrarum partem cruciatibus mille diris olim incognitis objiciendo, crudelitatem Hispaniensem plus quam ferinam, camposque suos sanguine natorum longe lateque undantes, fatis superque ultae videtur America. Namque minimi quidem facienda sunt commoda, quotquot a regionibus ejus opulentis repertis et exploratis possunt oriri, morbo teterrimo excitato, et valetudine commoda amissa comparata.

Multi,

Multi, et medici et alii, morbum venereum ex eo, quo in Europam primum in-
 vectus fit, tempore, multo minus gravem
 evasisse opinantur. Immo spem habent non
 parvam in mortales saevire tandem ex toto
 esse desitutum. Spe vero, quod magno-
 pere dolendum, inani se lactare videntur;
 morbus enim, si non ei per medicamenta
 idonea mature obsistitur, brevi admodum
 formidolosus fit, humores corrumpit, solida
 consumit, summam pulchritudinem in de-
 formitatem horrendam vertit, et, cum ad
 ultima ventum est, aegrotos miserabiles, ipsa
 morte graviora perpeffos, extinguit. Ex-
 empla hoc genus nonnulla vidi. Haec
 nostro seculo rarius videri confiteor, quod
 non gravitati luis sponte sua imminutae, sed
 huic tribuendum puto, quod morbus hodie
 plerumque non citius invadit, quam ad me-
 dicos, aut ad medicamenta quae in eum
 plurimum possunt, confugitur; namque
 mercurii efficaciam ne ipsa quidem plebe-
 cula ignorat.

Alii,

Alii, qui quidem longe numerosiores, gonorrhoeam et syphilidem, utcunque formalitèr sese differant, pro morbo uno eodemque habent; alii, contra, morbos ex toto diversos esse contendunt. Qui priorem in sententiam concedunt, ii modo sequente ratiocinantur. Cum et gonorrhoea et syphilis ab impuro coitu proficiantur, cum idem utraque eodem tempore infici possit, cum morbo venereo laborans uni gonorrhoeam, alteri syphilidem impertiatur, cumque idenique gonorrhoea, via mēdendi parum idonea adhibita, in luem converti so-
leat, vix ambigi potest quin pro morbo eodem debeant haberi. Qui in posteriorem eunt, ii sequentia ad diversitatem morborum demonstrandam quam plurimum conferre existimant. Syphilis et gonorrhoea in Europam diverso tempore immigrarunt, et illa diu, antequam haec se ostendit, longe lateque grassata est. Quinetiam incolae Europae luem veneream cum Sinenfibus ante plurimos annos communicarunt; gonorrhoea vero nuperrime tantum eos vexare
incepit.

incepit. Idem propemodum de insula, quae
 Otaheite appellatur, dici potest. Quamquam
 enim Angli vel Galli, vel quod verisimilius,
 utrique, Juem veneream, suae humanitatis
 et amoris pignus funestum, ibi reliquerunt;
 nulla tamen gonorrhoeae signa adhuc sunt
 orta. Syphilis neglecta, donec aegrotum
 occidat, semper ingravescit; gonorrhoea,
 contra, quidem increseit; brevi vero con-
 sistit, minuitur, tandemque ex toto decedit,
 curationem naturalem recipiens. Insuper,
 contagio syphilidis propriae vulnerei cuilibet
 admota syphilidem solam movet, nec aliam
 progeniem, quam gonorrhoeam, gonorrhoea
 habet. Praeterea, si syphilis et gonorrhoea,
 quod nonnunquam, uti omnes fatentur, in-
 cidit, in eodem conjungantur, illa sublata,
 haec manet, et spatium usitatum habet, uti
 Sydenhamius illustrissimis multique alii
 testantur. Porro, cum syphilis ulcuscula
 excitat, virus ex his profluens et urethrae
 applicatum gonorrhoeam non facit, nec
 materia in gonorrhoea ex urethra profusa,
 et ostiis vasorum glandis lymphaticorum
 patulis

patulis oblata, absorbetur et luem veneream progenerat. Mercurius denique syphilidem tollit, et nullum aliud, quod adhuc noverimus, eam depellere valet; in gonorrhoeam vero parum nihilve omnino posse videtur. Ex his omnibus, inquiunt, non sine causa gravi potest concludi, morbos inter sese ex toto differre.

Haec argumenta quidem primo aspectu speciosa esse videntur; multa vero, quae illis jure objici possint, non desunt. Quantum ad tempus, quo syphilis et gonorrhoea in Europam invectae esse dicuntur, diversum attinet, super hac re nihil hodie pro certo cognosci posse contendo. Auctores, qui morbum venereum primi sunt executi, gonorrhoeam silentio praeterivisse ponas. Hoc eam partes mortalium genitales non exercuisse minime probat. Neminem enim latet, non paucos medicorum, quibus morbum venereum apud Europam primum videre acciderit, novitate signorum et gravitate obstupefactos et perterritos, portentosas fabellas potius, quam notas morbi fideliter depictas,

depictas, memoriae prodidisse. Nec aliud incidere potuit, hominibus notitiam signorum, causae morbi et curationis justam nondum sibi adeptis. Quod vero omnem super hac re dubitationem ex toto tollit, est hoc, quod syphilis, ut postea clare evidenterque demonstrabitur, non ullam regionem diu infestare potest, quin gonorrhoeam, nec gonorrhoea, quin syphilidem, movere periclitetur. Hoc igitur quoque de Sinensibus et incolis insulae, cui nomen Otaheite inditur, supra comprehensa convellit. Idem quoque pleraque ex reliquis, quae protulerunt, argumentis infirmat. Syphilidem neglectam quidem semper ingravescere; gonorrhoeam vero curationem naturalem recipere, confiteor. Caeterum nullam morborum diversitatem hoc indicat. In hac enim virus in urethram, glandulis mucosis ubique abundantem, receptum, protinus ei stimulo est, secretionemque adauctam movet, qua citius feriusve tandem expellitur, et sanitas corpori redit. Sed in illa per vascula absorbentia humores ingressum, et iis admistum,

tum, e corpore nequit expelli, nisi ad mercurium decurritur, qui vel, universis secretionibus et excretionibus adauctis e systemate eluit, vel vi forsitan specifica extinguit. Ita causae morborum nullum discrimen, quamvis exitus ob rationem modo positam diversus. Quanquam materia gonorrhoeae propria glandi interdum diu admoventur, et luem non movet; hinc tamen minime cogi debet eam hoc praestare non posse. Namque, si erosio urethrae coriatur, absorberi potest, syphilidemque, ut omnes fatentur, progignere.

¶ Uno in exemplo vascula lymphatica locum erosionis inter et glandulas inguinales lateris dextri infimas manifeste turgere notavi. Quem tumorem bubo brevi est subsecutus. Caeterum, illis in casibus, ubi materia ex urethra profluens glandi longum per tempus applicatur luemque non facit, virus forsitan, quod saepe incidere videtur, sub initium morbi secretionem adauctam expellitur, quamvis secretio ipsa diu postea manet. Hanc materiam vero, licet secretionem
adaucta

adaucta non abluatur, luem non progignere, non est cur mireris, si tecum reputes unum ulcusculum, alterum, et hoc tertium, &c. non facere solere. Denique, fuit asseveratum, mercurium syphilidi mederi, gonorrhoeam depellere non posse. Quisnam vero medicus, morbis conjunctis, illam mercurio unquam sustulit, et hanc, quod incidere posse, modo demonstravimus, luem postea excitare vidit? Igitur, virus utriusque morbi tollit mercurius, quanquam secretionem adauctam gonorrhoeae propriam relinquit, quae in posterum ex toto innoxia, nihilque aliud quam stillicidium merum esse videtur. Hanc vero relinqui solere non est cur mireris, cum mercurius corpori vires convellat, et relaxationem urethrae et atoniam, unde haud dubie proficiatur, evidenter adaugeat. Haecenus verba tantum verbis opposui. Nunc vero proximum restat ut paucula proferam experimenta, omni ratione longe potentiora, quae hanc litem dirimendi consilio nuper institui.

†

B

EXPER.

E X P E R. I.

Materia contagiosa ex ulcusculo profusa, postquam morbus breve manserat spatium, et antequam ulla adhibita fuerant medicamenta, in urethram immissa, gonorrhoeam virulentam generavit, quae progressum eundem et finem habuit, ac si modo vulgari fuisset excitata. Hinc, quantum in errorem inciderint qui gonorrhoeam syphilidis propaginem non esse posse contendunt, plane apparet. Quinetiam non absque causa gravi hinc quoque debet concludi, virus utriusque morbi idem esse, et nulla ex parte differre. Admodum enim probabile est, virus syphilidis materiam sui ex toto similem eundem in modum generare, quo fermentum cuilibet substantiae, in qua fermentatio possit moveri, admotum, eam naturam in suam mutare consuevit.

E X P E R.

EXPER. II.

Materia, quae ex urêthra gonorrhœa virulenta laborantis profluxerat, cuticulae scatis profunde incisae fuit insita. Pars, cui virus admotum, utpote quae maxime conveniret, fuit superficies praeputii interior. Ab ulla viri actione partes vicinae linteo sunt defensae. Hoc in exemplo virus nullum omnino effectum edere visum; vulnus enim speciem ex toto communem prae sese tulit, et tribus quatuorve diebus fuit sanatum. Hoc experimentum, sed non cum successu prosperiore, frequenter reiteravi; nunquam enim ulcusculum venereum potui movere.

Hunc vero exitum, qui votis quidem minime respondit, huic causae tribuendum puto, quod materiam ex urêthra viri, qui dies decem duodecimve morbo laboraverat, profluentem linamento excepi, quo tempore forsitan virus ex toto fuerat expulsum, vel muco ita dilutum et debilitatum, ut juvenem,

nem, cui fuerit insitum, morbo nequiverit inficere. Quo tempore in his experimentis instituendis versatus sim, nullum primis morbi diebus virus potui comparare. Quod si adeptus fuisset, exemplo sequente aliisque similibus inductus, minime dubito quin syphilidem pro certo movisset.

Vir quidam fidei plenus, quocum multum amicitiae et familiaritatis mihi intercedit, quique medicinae multos per annos diligentissime studuit, Edinburgo discessit gonorrhoea virulenta laborans. Quodam vespere, vino et libidine perquam inflammatus, rem cum puella rustica infeliciter habuit. Duobus mensibus aut circiter elapsis, dolorem faucium miseranda conqueri coepit. His inspectis, ulcera tonsillarum gravia se evidenter ostenderunt; quae mercurii usu tuto et secreto fuerunt sublata. Nihil omnino causae est, cur puellam alius viri, puri impurive, notitiam habuisse suspicetur. Impuri non potuit. Ibi etenim nemo, uti probe novit, praeter semetipsum, aut eo tempore, aut postea, morbo venerico colluctatus est.

Alterum

Alterum insuper exemplum in praesentia novi, ubi gonorrhoea in luem manifestissime desit. Multa quoque alia idem genus proferre non foret difficile; haec vero sufficiant.

Ex omnibus denique, quae supra fuisse proposuerim, haud dubie debet concludi, gonorrhoeam et syphilidem pro uno eodemque morbo debere haberi, virus utriusque esse idem, et signa tantum pro loci diversitate, quem teneat, diversa movere.

Hanc ob causam, omnia morbum, utrumque spectantia conjunctim, non separatim, exequi decrevi.

Aliud tantum, priusquam ad historiam venit, experimentum liceat enarrare, quod utrum mercurius viro venereo adjunctus actionem ejus necne impediat detegendi causa fuit institutum.

EXPER.

E X P E R. III.

Virus ex ulcusculo effusum argento vivo puro, e mucilagine gummi Arabici caute et diligenter extincto, admistum. Variis corporis partibus, quibus incisa fuerat cuticula, insitum nullum effectum edidit. Plurima hujus, sed semper frustra, facta sunt pericula.

Nonne hinc cogi potest, mercurium virus venereum iners efficere, et vi sua specifica extinguere? Nonne vis eadem plane demonstratur, cum ulceribus foedis externis applicatur, ea purgat, erosioni eorum ulteriori finem facit, et citius quam speres ad sanitatem reducit? Vix mihi possum temperare, quin hanc in sententiam concedam, cum reputo plerisque in exemplis lue venerea laborantis sanationem non a sputo, perspiratione, aut excretionem alvina auctis, pendere, sed mercurio in systemate accumulato et retento, pro rata ratione, respondere videri. Exemplum hujusmodi luculentissimum
in

in operibus clari Wisemanni chirurgicis reperiundum, ubi virum generosum syphilide gravissima et inveterata conflantem libris unguenti mercurialis fortioris tribus dimidioque inunxit; nullum tamen, vel parcissimum, licet alia e mercurio praeparata eodem tempore non parum liberaliter ei danda curaverit, sputum, vel quamlibet aliam evacuationem, valuit movere. Ægrotus tamen e morbo emerfit, et ex toto convaluit.

HISTORIA MORBI.

Prima luis venereae signa in parte, cui virus fuit admotum, plerumque se ostendere solent. Ea autem, quae ab eo urethrae vaginaeve applicato proficiscuntur, et gonorrhoeam, uti appellatur, constituunt, prius referuntur; deinde ea, quae virus per lymphatica systema ingressum excipiunt, et luem inveteratam syphilidemve, uti vocatur, subesse testantur.

Priore

Priore in exemplo, impurum post coitum viginti quatuor horis nonnunquam, plerumque vero quatuor, quinque, sexve diebus, prima morbi signa apparere incipiunt. Aliquando, sed rarissime, post tres hebdomadas oriuntur.

Urethra virili affecta, pruritus circa glandem insolitus sentitur, quae aliqua ex parte tumida, et, praeter consuetudinem, dura, cum rubore partis ejus extremae parvulo, evadit. Ostium urethrae quoque solito apertius esse videtur, et paucis in exemplis testiculos sibi quasi rotari notat infectus. Brevi postquam haec signa se ostenderunt, guttula materiae, muco sano magis albae, ex urethra exprimi potest, quae parietes ejusdem propemodum conglutinat. Materia albida, increfcit, et inflammatio circa urethram extremam evidentior evadit. Haec per totam suam longitudinem plerumque nunc tenditur, et durefcit, lacunis interea tumefactis, et pene quasi stringeretur, potissimum dum erigitur, sensum habente. Quod ex urethra profunditur, id quantitate auge-
tur,

tur, tenuius fit, et non amplius tenax est, colore flavum aut subviride. Nunc rubor urethram extremam perpetuus occupat. Inter urinam evacuandam urethra distensa saepe dolet. Ostium vero hujus versus, ob vim urinae descendens stimulatricem, dolor gravissimus est, et rubor modo comprehensus protinus post urinam redditam augetur. Dum penis tentigine afficitur, ne urethra extendatur inflammatio cavet. Igitur hoc tempore coles summo cum dolore deorsum incurvatur, qui, si ventrem versus elevetur, augetur. Quae irritabilitas per hoc morbi stadium adest, ea cur tentigo oriatur saepe in causa est, praesertim dum in lecto cubatur. Somnum nonnunquam adimit, vel aegrotum expergeficit, et ut semen absque voluntate excernatur aliquando facit.

Materia nonnunquam tenuissima est, vel sanguine tingitur; omnia inflammationis signa graviora sunt, et aegrotus stranguria tentatur. Quinetiam praeputium extremum aliquando inflammatione corripitur, et reduci nequit, quod *phymosis* appellatur; vel

†

C

pone

pone glandem retractum rursus induci non potest, cui nomen inditur *paraphymosis*. Rebus ita se habentibus, inflammatio strictura augeri potest, et gangraena sphacelusque moveri. Si praeputium universum tumore oedematoso afficiatur, *phymosis* quoque vocatur. In omnibus his exemplis; praesertim in duobus posterioribus, ulcera periclitantur oriri.

Hoc modo inflammatio per unam alteramve hebdomadam increcere pergit; sed curationem recipit naturalem; namque secretio muci adaucta virus venereum aequo cito, ac formatur, abluit, donec e corpore tandem ex toto expellatur. Dum hoc vero peragitur, signa in aliquantum temporis propemodum immutata manent. Posthac gradatim decrescunt. Tentigines rariores, nec tantum doloris movent. Inflammatio minor, et minus doloris excitat urinae excretio. Quod ex urethra profluit, id crassius, magis album et tenax evadit, et quantitate gradatim imminuitur. Modo copiosius, modo parcius excernitur ad extremum,

et

et portiunculae muci, speciem fibrarum aliquam prae sese ferentes, urinae miscentur. Fluxus tandem cessat, et signa inflammationis sensim decrefcentia aegrotum relinquunt.

Viro ex urethra expulso, secretio, aliquot in exemplis, per menses, vel nonnunquam annos pergit, parcior, crassior, magis alba, minore inflammatione stipata, ad extremum plerumque sponte decedens. Vel, non sublato et extincto viro, signa manent, quamquam minore cum inflammatione plerumque, quam sub initium. Vel ulcera oriri, virus absorberi, luesque venerea excitari possunt, praesertim cum aliquid recens inflammationem movere valens corpori applicatur, cum morbus inveterat, vel mucus infectus glandem inter et praeputium diu manere permittitur. Quinetiam, nonnullorum iudicio, absorptio absque ulcere incidere potest. Caeterum rem ita sese habere nondum comperitum habemus.

Si virus admovetur vaginae et urethrae muliebri, a calore, pruritu, molestiacque sensu,

fu, partes circa genitales incipit morbus. Haec subsequuntur ostii urethrae ejusque viciniae rubor, se ad introitum vaginae diffundens, fluxus humoris supra depictum omnino referens; dolor, saltem plerumque, cum urina excernitur, cum partes inter sedendum pressura afficiuntur, cum ambulatur, vel cum vagina distenditur. Morbus eundem progressum finemque, quem in maribus, habere consuevit, praeterquam quod signa, postquam menstrua provenerunt, nonnunquam ingravescent. Si vaginam solam invadat, perquam leves saepe sunt inflammationis notae, vel, si sub initium se ostendunt, decedunt, adeo ut aegrota vix ullum aliud incommodum quam fluxum quera-
tur.

Gonorrhoea, vel humoris e partibus externis profusio, rarissime incidit. Cum accedit, a rubore partis laborantis, glandis ex-
gr. et tumore incipit. Superficies ejus crusta albida aphthas reddente cooperitur, et deinde materia profusae ex urethra similis ex ea exudat, inflammatione sub initium
incref-

increfcente. Virus autem gradatim abluitur, et progressus et finis a fupra pofitis nihil parumve differunt.

Infuper, in oculis et naribus poteft oriri gonorrhoea, cujus figna, quantum partis diverfitas patitur, fupra tradita referunt.

Cum gonorrhoea diu manet, partis, unde humor profunditur, praefertim urethrae virilis, ftricturam nonnunquam facit, adeo ut urinam reddendi difficultatem, magno dolore faepe ftipatam, lotio in modum rivuli contracti, vel guttatim tantum effluente, foleat movere. Aliquando quoque veficae nonnihil inflammationis, et ad fe contrahendam proclivitatem infert, unde, urethra fe eodem tempore constringente, transitus lotii multo etiam difficilior efficitur. Hic autem affectus per mucum ex his partibus liberaliter fecretum plerumque tollitur, fed eodem modo, quo inflammatio veficae vulgaris, poteft finiri. Saepe nullum hujusmodi vitium oritur, vel, fi revera invadit, fpon te decedit, et urinae difficultas et dolor annos per aliquot manent.

Strictura

Stricture similis urethram foemineam, sed multo rarius, et vaginam quoque infestat, distensionem hujus impediens. Quinetiam praeputium virile extremum invadit, et, omnibus aliis signis sublati, ne retrahatur cavet.

Partes quoque vicinae, velut testes, glandulae inguinales, et perinaeum interdum, inflammationi objiciuntur, praesertim si exercitatione nimia, pressura graviore aliisve, quae vim stimulantem habent, irritentur.

Cum testiculos inflammatio corripit, ut solet, tumescunt, dolent, calescunt, durescunt, rubescunt, &c. et quod ex urethra profunditur, id eodem tempore plerumque imminuitur, aut ex toto cessat. Haec autem curationem naturalem recipit; namque, si vel sponte vel arte restituitur fluxus, plerumque decedit. Tumor vero testiculorum et durities longum per tempus saepe manent, reliquis signis sublati.

Glandulae inguinum lymphaticae, licet nihil viri absorptum fuisse videatur, cum nihil noxae inflammationem subsequatur, nonnunquam

nunquam inflammantur. Hoc, ob irritationem urethrae, cum iis aliquo modo communicatam incidat necesse est.

Si virus alii parti, quam urethrae aut vaginae, applicatur, et quod syphilis luesve venerea nominatur movet, primum oriuntur inflammatio parvula erysipelatosae, et pruritus glandis, praeputii, labiorum pudendi, vel cujuslibet alius partis affectae. His succedit una pluresve exiguae pustulae, humore pellucido, qui nonnunquam albus evadit, repletae. Hae rumpuntur, et ulcus parvulum, semet vero undique diffundens, formatur, aliquando dolens, plerumque inflammatum, tactus impatiens, fundo inaequale, sanatu difficile, cujus margines duri sunt, tumidi, colore cinerei, crustis albidis operiti. Si morbus, quod rarissime evenit, ab ulcere urethrae, sine gonorrhoea, incipit, pars affecta tactum refugit, urinam excernendi desiderium est, inter eandem reddendam, postve redditam, dolor, et exiguae humoris tenuis et aquei quantitatis exudatio.

Haec

Haec signa nonnunquam excipit gonorrhoea.

Si ulcus vulnufve inficiatur, inflammatur, semet cum teneritudine vel dolore spargit, superficie inaequale, crustis albidis saepe obductum, marginibus cinereum.

Si pueri a matribus inficiantur, aliquando cum signis morbi, qualia sunt cutis inflammationes, cuticula nulla vel tenuissima, gonorrhoea, &c. in lucem suscipiuntur. Plerumque vero nullae complures in dies notae se ostendunt. Hebdomada tamen aut circiter, papulae cum crustis subfuscis, in ulcera vertentibus, circa angulos oris aliasve capitis partes, vel universum per corpus, oriuntur.

Ex ulceribus, ubicunque sint sita, virus per lymphatica absorbetur, et dum transit, ea inflammat, ruborem, duritiem, et dolorem, per cursum, quem ad primam glandulam lymphaticam tenent, manifestissime movens. Saepe tamen nullum hujusmodi signum se in conspectum dat.

Siye

Sive hoc incidat, sive res se aliter habeat, primarum glandularum, per quas transeunt, inflammatio, quae *bubo* appellatur, frequenter excitatur, qui, cum partes genitales primum inficiantur, in inguine saepissime oritur. Sub initium, durefcunt et tumescunt glandulae, tactus intolerantes. Haec signa increfcunt, et dolore, praesertim inter movendum, rubore cutis, aliisque, quae inflammationem designant, stipantur. Bubo autem modo celeri, modo, ut in aliis glandularum inflammationibus incidit, tardissima suppuratione, modo schirro, rarissime gangraena finitur. Quod ulcus oritur, id aliquando periculo non vacat, quod serpere sinusque formare periclitatur, quodque vasis sanguiferis amplis est vicinum. Sanatum saepe difficile.

Cum virus venereum systema ingreditur, inflammationes plerumque, et ulcera in aliqua corporis parte, saepissime in membrana mucosa vel cute, excitare consuevit. Modo complures per annos innocuum manere, modo se nunquam ostendere, ab auctoribus

†

D

dicitur.

dicitur. Huic vero fides non temere habenda. Aliquandiu plerumque fuit absorptum, antequam ulla signa oriuntur.

Si in glandulis oris fauciumve secernatur, membranam has partes succingentem inflammatione afficit, et ulcera raucitate, dolore, difficultate devorandi, &c. stipata, facit. His autem ulceribus serpentibus, ossa cariosa evadunt, et, palato consumpto, itinera os inter et nasum patefiunt, et nasum ipsum, cartilaginibus ejus et ossibus quoque exesis, subsidit.

Si in cute secernatur, maculas subrubras, purpureasve, vel exanthema crustis subfuscis, quae in ulcera saepe vertuntur, obducunt movet. Haec, si incidunt in volis, plantis, anumve circa, speciem fissurarum in cuticula prae sefe non raro ferunt, materiam tenuem magno cum dolore exudantia.

Si in oculis secernatur, inflammatio et exulceratio cum caecitate ibi oriuntur; si in auribus, eadem inflammationis signa, quanquam minus crebro, cum surditate, ossiumque iis propriorum carie, moventur.

Quamvis

Quamvis partes genitales non primum fuerunt infectae, morbus ibi nonnunquam et circa anum, sed rarius, apparet.

Ulcera pulmonum et phthisis interdum oriuntur. Aliquando quoque tument lymphatica aliaeque glandulae.

Si morbus inveterat, periosteum et ossa invadit, et dolores iis infert, qui potissimum aegroto molestiam faciunt, corpore calefacto, et per naturalem paroxysmum febris vespertinum, quem evidentiolem efficiunt, simul cum eo mane versus, orto sudore, decedentes. Periosteum tumet et durefcit. Ossa tumere videntur, et interdum revera tument. Nonnunquam, potissimum media durissimaque parte, mollia vel cariosa fiunt, et, medulla affecta, acerrima reddita, et ex iisdem extremis effusa, adeo fragilia reduntur, ut, vi levissima iis illata, frangi periclitentur. Interdum antequam virus systema ingreditur, vel quolibet alio morbi tempore, oriuntur tubercula in glande, praeputio, labiis pudendi, ano, &c. vel ubi ulcera fuerunt, vel ubi se nunquam ostenderunt, figura

gural diversa, plerumque rubra et mollia, nonnunquam dura et callosa, raro dolentia.

Alia, denique, corpora morbo multos per annos obsistunt, progressumque ejus retardant; alia, contra, ei brevi succumbunt; adeo ut aegroti miserandi hecica vel hydrope correpti fato concedant.

NOTÆ, QUÆ EUM AB ALIIS SUI SIMILIBUS SECERNUNT.

LIII. Gonorrhoea virulenta ab ea, quae benigna, est vel a viro venereo non proficiscitur, distinguatur necesse est. Nec hoc praestare difficile. Signa enim, et causae morborum a se invicem longe discrepant. Quod in hac ex urethra profunditur, id quantitate plerumque multo minus est, et nunquam contagiosum, ardor urinae levior, inflammatio minus gravis. Haec quidem frigore, exercitatione immodica, similibusque intendi

et

et aequè concitata, ac in specie virulenta, reddi potest; sed sponte paucis diebus semper decedit, nec diu post eam secretio aucta solet manere. Insuper, species benigna a causis, quae virulentam non possunt movere, universa nempe debilitate, purgantibus valentioribus, exercitatione parum modica, venere frequentiore, sed pura, frigore, potatione nimia, &c. evidentissime profluit.

2. Summa gonorrhoeam inter et fluorem album similitudo intercedit. Dignosci tamen possunt. Gonorrhoeam enim recentem comitantur ardor urinae; labiorum naturalium externorum partiumque vicinarum tumor, inflammatio, et non raro exulcerationes leviores; doloris nonnihil intercoeundum. Haec autem omnia in mulieribus, quae leucorrhoea conflictantur, raro semet ostendunt. Quinetiam, fluore albo laborantes dolore lumborum magis minusve acuto tentantur, quem gonorrhoea recente correptae fere nunquam queruntur. Cum gonorrhoea vero inveteravit, magis difficulter unum morbum ab altero distinguere.

gues. Secernere tamen valebis, si memoria teneas signa inflammationis gonorrhoeam semper sub initium, licet postea in stillicidium perpetuum, ex toto magnave ex parte inflammatione destitutum, mutet, comitari; nunquam vero fluorem album praecedere. Praeterea, quod in hoc profunditur, id multo copiosius; excretio enim in stillicidio admodum modica. Insuper, magna corporis debilitas et relaxatio, vitia ventriculi, &c. mulieres fluori albo opportunas efficiunt, et, nisi his praecedentibus, morbus, nunquam accedit. Absque vero ullo hujusmodi seminio gonorrhoea invadit, quam, viribus nondum, aequae ac in leucorrhoea convulsis, stillicidium consuevit excipere. Si denique ulcera, quae utrique morbo sunt communia, in vagina oriantur, signa luis inveteratae, si morbus a venere impura fuerit profectus, in reliquo systemate brevi se evidenter ostendent; si vero, contra, morbus sit leucorrhoea, nihil hujusmodi timendum, nihil hujusmodi incidere potest.

Si

Si morbus uterque, quod accidit nonnumquam, eodem tempore invaserit, unus ab altero nequit fecerni, nisi veram mali naturam investiganti, salutis desiderio icta, mulier ipsa praeluceat.

3. Ulcuscula venerea, quae a coitu recente impuro fuerunt profecta, et sede et signis ab aliis ulceribus non parum manifeste distinguuntur. Partes genitales, labia et loca vicina, papillas mammasque muliebres, ubi ulcera, saltem serpentina, rariora, tenent. Papulas, sub initium, miliariae proprias referunt, brevi eminentiora evadunt, et parvas vesiculas formant, quae ruptae modo humorem tenuem et aqueum, modo materiam crassiolem et flavam, effundunt. Marginibus plerumque dura sunt et dolent, et partes vicinas erodendo semetundique diffundunt.

Quantum ulcera spectat, quae a lue inveterata oriuntur, ab aliis omnibus fere apertius etiam fecernuntur. Super ossa, ea potissimum quae musculis tenuissime sunt obducta, solent sedere, marginibus inaequalia,

lia, et quasi denticulata, nec non aliqua ex parte callosa. Speciem non raro admodum singularem prae se ferunt, in formam quasi calicis excavata, fundo plerumque angusta et contracta, marginibus gradatim se dilatantibus, donec ad oram extremam usque perveniatur. Res saltem plerumque, nisi ossa cariota ad fundum sint sita, ita se habet. Quod si incidit, materia fungosa molesta fere replentur. Non multum doloris habent, hoc a cancris discrepantia, qui calore ardente et doloribus lancinantibus stipari consueverunt. Nonnullis tamen in exemplis res se aliter habet. Quod ex omnibus hujusmodi ulceribus profunditur, id prius tenue est, deinde ad extremum magis tenax et viscidum, quam pus bonum et laudabile evadit, colore singulare et subviridiflavum, odorem perquam gravem, a foetido putridoque vulgari tamen differentem, emittens.

4. Bubones hujus morbi proprii ab iis, qui a fonte non venereo profluunt, debent dignosci. Quin vero a concubitu impuro proficiantur,

proficiscantur vix ambigi potest, si tumores artuum inferiorum et abscessus non sint, si gonorrhoea, praesertim ulcuscula, praecesserint, licet lymphatica haec inter et illos intercedentia tumore et distensione videantur carere.

5. Qui dolores lue venerea conflictantes noctu invadunt, ii ab arthritidis et rheumatismi propriis non difficulter secernuntur. Namque venerei ossa media partesque horum solidissimas occupant, aliis morbi signis antecedentibus, plerumque substantibus. Arthritici, contra, cum affectionibus ventriculi aliarumque partium internarum saepe alternantes, ex intervallis, articulos minores; rheumatici, ab externa, et plerumque evidente causa, nempe frigore, proficiscentes, tractumque musculorum sequentes, pyrexia fere semper praecedente, saepe comitante, majores infestant. Hi quoque, febre absente, calore lecti vel alio externo levantur. Caeterum venerei eodem adaukti magis acriter urgent.

†

E

CAUSÆ.

C A U S A E.

Alios aliis ad hunc morbum procliviores esse, neminem potest latere. Nonnulli enim veneri libidinique dediti multos per annos morbi immunes vivunt, quanquam coitum impurum nunquam refugiunt, sed, periculo contagionis semet, quoties occasio exoptata subministratur, scientes objiciunt. Hofne adversus vim morbi tutos reddit cuticula crassior et firmior, absorptioni inimica? Alii, contra, iique longe plures, non citius cum impura rem habent, quam in morbum incidunt. Quidnam vero hos illis morbo opportuniore efficiat, in primis dictu difficile. Hocne praeferat vis lymphaticorum absorbens major, qua virus venereum in systema facilius devehitur, vel irritabilitas corporis praeter consuetudinem magna, unde fit ut acre virus inflammationem in eo, et reliqua signa morbi propria, certius possit movere; vel cuticula tenuior?

Quae

Quae causa morbum constanter excitat, ea est virus venereum. Aliae ab auctoribus nonnullis idem praestare dicuntur. Si vero eas attentus examinaveris, adeo ridiculas esse reperies, ut omnino sint indignae, quae serio excutiantur.

Causa proxima est viri ipsius acrimonia, cujus natura nondum fatis intellecta; ab hac enim omnia et gonorrhoeae et luis signa proficisci videntur.

PAUCULORUM E SIGNIS EXPLICATIO.

I. Quod nostram attentionem primum sibi vindicat, id est, humoris ex urethra profusio. Hanc haud dubie facit virus venereum urethrae superficiei interiori applicatum, quod e particulis acerrimis conflatum, si ex effectibus saltem quos edat liceat judicare, ei stimulo non esse non potest. Quaecunque autem pars corporis humani stimulo insolito afficitur, eam versus semper fit cursus

curfus humorum adauctus. Exemplum
 hujusmodi praebeant vis frigoris stimulatix
 membranae Schneiderianae, vel cuilibet alii
 corporis parti applicata, emetica in ventri-
 culum, purgantia in intestina agentia. Has
 partes versus enim brevi fit impetus humo-
 rum solito major, glandulae mucosae irri-
 tantur, et quantitatem humoris proprii prae-
 ter consuetudinem magnam secernunt. Quod
 excernitur, id quoque solito acrius evadit,
 ut profusio e membrana nares succingente
 in catarrho facta evidenter demonstrat. I-
 gitur minime mirandum, virus venereum
 urethrae admotum secretionem adauctam
 movere, et hanc praeter consuetudinem a-
 crem evadere. Hoc vero, non absque cau-
 sa gravissima forsitan, gonorrhoea virulen-
 ta substante, viro, humores quos glandulae
 urethrae numerosissimae secernunt, natu-
 ram in suam mutanti tribui debet. Qua
 ratione virus urethram ingrediatur, hic quae-
 ri potest. Super hoc alii in alias sententias
 iiverunt. Quidam per glandem, ut per spon-
 giam, in urethram penetrare credunt. Mem-
 branac.

branae vero superficiem glandis, externam inter et urethram intercedentes, ne hoc incidat haud dubie cavent. Nonnulli vascula glandis lymphatica ingressum per ea ad urethram devehì opinantur. Si vero absorbentia intret, non alio, ut neminem rei anatomicae peritum fugit, quam ad glandulas inguinales deduci potest; has enim versus omnia vascula glandis lymphatica cursum plane tenent. Virus urethram ipsam, ut aqua oleumve duas superficies vitreas planas sibi invicem applicatas, ad certam altitudinem saltem attractione scandit, vel eidem extremae admotum, humores urethrae natura et indole sua impertiendo, et ita semet ipsum propagando, ingredi in primis probabile.

Quo omnia causam excretionis adauctae spectantia ad finem perducamus, virus, quocunque modo in urethram immittatur, ejusdem exulcerationem, ut incisiones virorum celeberrimorum Morgagnii et Monroii testantur, non raro facere, et hoc modo quoque ad secretionem adauctam movendam, et
longum

longum per tempus continuam reddendam, non parum conferre posse, habetur comper-
tum.

Rationem, cur profusio ex urethra, viro excretionē adaucta medicamentisve sublato, saepe diu maneat difficulterque tollatur, probabilem saltem reddere non admodum difficile videtur. Si cursus humorum ad aliquam partem semel fuerit factus, ei in posterum aegre obsisti consuevit. Exempla, quae hoc probent, haemorrhagiarum et profluviis Ordines Culleniani quotidiana suppeditant.

2. Hic morbus, praesertim cum gravior et diu manet, stricturas urethrae et carunculas aliquando relinquit. Illae, ab exulcerationibus et cicatricibus postea inductis, quae partem vel angustiores vel eminentiores, quam ante, ut in locis externis, quibus cicatrix fuit inducta, incidit, relinquere possunt, proficisci videntur. Hae a tunica urethrae interiore, per longitudinem morbi nimis relaxata, plicasque formante, quae descensum urinae magis minusve impediunt,

pediunt, forsitan oriuntur. Quinetiam interdum forsitan eandem per tunicam, inflammatione crassiolem et duriolem redditam, possunt excitari; namque Monroius celeberrimus duo vel tria exempla vidit, ubi aliquid cristam galli referens excreverat.

3. Gonorrhoea non raro testiculis tumores infert. Alii alii causae hoc tribuendum putarunt. Vir celebris Astruc, et multi alii, materiam morbificam ab urethra ad testes aliquo modo transferri credunt, hoc forsitan magna ex parte inducti, quod fluxum ex urethra, tumore testiculorum oriente, sistere notant. Quo modo vero, ad testes potest devehiri? Ubi sunt vascula vel ductus, qui hoc possunt praestare? Si absorbentia ingrediatur, non ad testes, sed ad glandulas inguinum proprias, ut supra comprehensum, deducetur. Nonnulli sibi in animum inducunt, ostia vasorum deferentium intrare, et retro ad testiculos tendere. Qua vero ratione viam sibi per canales adeo tortuosos reperire et patefacere valet? Denique, per lymphatica, qua solum ire potest, systema ingressam

ingressam esse, ponas testiculi affici non multum periclitarentur; paucissima enim exempla se ostendunt, ubi lues testium excitat tumores.

Solam hujusce phaenomeni explicationem probabilem et rationalem in medium primus protulit Monroius, anatomicorum hujusce seculi facile princeps. Gonorrhoeam ipsam et testium tumorem ab eadem causa, inflammatione nempe urethrae et irritatione, proficisci contendit. Quae argumenta hoc probandi consilio adhibet, ea sequuntur, et plenissimam haud dubie opinioni ejus fidem conciliant. Si cuilibet irritamento praeter consuetudinem magno, calculi exempli gratia descensui, objiciatur urethra, tumor testiculorum periclitatur oriri. Chirurgus in primis celebris Samuel Sharp, dum operationem lithotomicam lateralem depingit, testiculos nonnunquam tumere notat. Si irritatio autem urethrae, &c. hoc in exemplo, tumorem testiculi excitat, quid obstat quo minus eadem causa eundem in gonorrhoea effectum edat? Immo eundem

haud

haud dubie saepe edit, cum morbus in urethram altius descendit, partem membranae ejus prope ostia ductuum seminiferorum inflammatur, vasa deferentia extrema claudit, et irritationem per ea ad testiculos usque diffundit. Ita tumor testiculi eodem modo irritationem urethrae, quo lachrymatio oculi, quo aucta salivae excretio oris, subsequitur. Quod, denique, omnem super causa tumoris testiculi dubitationem tollit, est, quod tumor vas deferens primum occupat, et per epididymidem ad testem retro tendit. Si vero a materia venerea contagiosa massae sanguinis admixta oriretur, glandula fecernens prius, ductus deinde virus excernens, afficeretur. Quinetiam, cum tumor decedit, primum ad vas deferens, deinde in epididymide, denique in teste imminuitur.

4. Qui bubones in lue incipiente oriuntur, ii haud dubie a viro per lymphatica absorpto, ad glandulas dejecto, et eas intertranseundum irritante et inflammante, pendunt.

5. Quae exulcerationes et erosiones partium corporis diversarum, et laxiorum et

†

F

solidarum,

solidarum, incidunt, eae ab acrimonia viri plane evidenterque proficiscuntur. Qualis autem hujus acrimoniae vera natura sit, ex toto ignoramus. Nec exponere possumus, cur ex magna locorum copia fauces sibi potissimum deligat, ubi plerumque effectus suos perniciosos primum ostendat. Nihil luminis difficultati offundit affirmare a glandulis plurimis virus ibi liberalius, quam alibi, fecernentibus oriri. Responderi enim potest, cur non intestina, ubi glandulae vix minus sunt numerosae, aequae mature invadit. Nec denique ratio cur ossa firmissima, non maxime laxa, infestet, bona reddi valet. Haec vero et multa similia sagacitati scriptorum, qui nos sequuntur, illustranda relinquamus oportet.

E V E N T U S.

Hic plerumque nostro saeculo faustus. Exemplo in nullo fere, cum multos per annos hoc morbo conflictati ad extremum convaluerint;

convaluerint, licet admodum longe sit pro-
vectus, et corpus miserandum in modum
foedaverit, salutem aegroti, saltem ejus le-
vamen, desperandum; sed ad mercurium,
medicamentum illud praestantissimum, quod
tot millia faucibus Orci eripuit, et mortem
infatiabilem praeda sua toties insperato spo-
liavit, confugiendum.

R A T I O M E D E N D I.

Hanc duas in sectiones dividere decrevi-
mus. In priore, de gonorrhoeae, in posteri-
ore, de luis curatione, quam maxime presse
agemus, theoriam morbi fusius forsitan,
quam justae dissertationis hujusmodi limites
patiuntur, jam executi.

I. Consilia autem gonorrhoeae medendi
tria esse videntur:

1. Viro, cuilibet corporis parti admoto,
antequam

antequam notae inflammationis ullae seimet ostenderunt, occurrere.

2. Signa inflammationis tollere.

3. Tonum partibus morbo debilitatis red-
dere.

Hic morbus haud dubie, in morem aliarum inflammationum loco propriarum, sponte aliquando decedit, nihil incommodi post sese relinquens. Semper tamen agendum est, ut, si fieri possit, ex toto praecaveatur, et spatium solitum habere non permittatur. Igitur ea sunt dicenda quae consilio 1. respondent, vel viro, antequam inflammationem movit, occurrunt. Haec autem duplicia sunt, quae virus, cum id contingere possunt, extinguere putantur, vel talem excretionem ex urethra mucii faciunt, qualis ad virus una secum expellendum accommodari videtur.

Prioris autem generis sunt e mercurio praeparata, unguentum, ex. gr. mercuriale, vel corrosivi sublimati ex aqua destillata solutiones. Illud partibus genitalibus ante coitum, postve eundem, diligenter illitum, morbo

morbo venienti potenter occurrere creditur. Et nonnulla quidem exempla novi, ubi haec morbum praecavendi ratio veneri promiscuae in primis deditos aliquot per annos, et gonorrhoeae et luis immunes servare visa. Namque, per incuriam neglecta, in eas aequae cito et facile, ac in alios, morbus invasit. Hae in urethram post coitum impurum immixtae non tantum morbo feliciter occurrunt, sed eundem, ut multi quibus summa fides potest haberi testantur, postquam prima, a quibus incipere solet, signa accesserunt, depellunt. Cum solutiones hujusmodi parantur, singulis aquae ūnciis granum mercurii corrosivi unum tantum adjiciatur. Si hoc modo confectae urethram irritant, et inflammationem movere periclitantur, quantitas mercurii etiamnum imminuatur. Quod vero in inflammationem multum potest, est, solutionibus modo positis adhibitis, paulum tepidae in urethram protinus injicere. Nonne utilitas mercurii hoc modo adhibiti potestatem virus extinguendi singularem ei inesse demonstrat?

Ex

Ex his autem, quae excretionem muci adauctam movent, et hoc modo ad virus ex urethra expellendum conferre putantur, praecipuum est lixivium causticum. Reliqua hoc genus praeteribimus, studio brevitatis adducti. Ratio autem lixivium usui accommodandi est, unam hujus forsitan viginti aquae partibus adjungere. Solutio adeo fortis fit, ut gustanti aliquantum calida videatur. Post coitum in urethram, cum primum fieri potest, immittenda. Secretionem muci pauculos in dies excitat copiosam, quae ut virus una cum mucositate expellatur facere creditur. Quod haud dubie nonnullis in casibus praestat. Cum vero gravissimam inflammationem nonnunquam moveat, et non pro certo morbo venientibus semper occurrat, usu ejus ex toto abstinere, et fiduciam nostram in mercurii corrosivi solutione, quae remedium multo tutius et certius esse videtur, collocare praestare judicamus. Unum e praeparatis e mercurio, calomelas nempe, in pulverem quam maxime subtilem redactum, quod a multis, potissimum

tiffimum a chirurgo celebri Londinenſi, virus gonorrhoeae et recentis et provectioris extinguendi, et non abſque ſucceſſu proſpero, et ſine ullis, ut ferunt, ſequelis periculofis, conſilio adhibetur, memorare ſumus obli-
 ti. Hoc alicui liquori, aquae forſitan, accuratiſſime admifcent, et in urethram immittunt. Denique, impurum poſt concubitum, urinam reddere, eaque omnes partes genitales diligenter lavare praefidium ſanitati minime contemnendum eſſe videtur. Nullos liquores vi aſtringente, praefertim fortiore praeditos, in urethram, quanquam hoc facere moris multorum eſſe novimus, injiciendos putamus; tantum enim abſunt ut oſtia lacunis, quod nonnulli ſibi perſuadent, conſtringant, et ita virus intrare prohibeant, ut, contra, idem ingreſſum expelli impedian, et ad luem movendam magno-
 pere conferant. Haec de primo conſilio dixiſſe ſufficiat.

Conſilio

Consilio II. respondent remedia sequentia:

1. Sanguinis detractio. Haec, morbo minus gravi, non necessaria. Notis vero inflammationis magnis, et diathesi phlogistica invalescente, ad eam decurrendum, et pro gravitate signorum reiterandum. Loco propria generali praestare videtur, urgentibus phymosi et paraphymosi.

2. Cathartica. Haec semper leniora esse debent, qualia sunt manna, cremor tartari, alique medii sales, oleum ricini, &c. Alvus tantum soluta teneatur, et non saepius semel bisve de die moveatur; hoc enim modo inflammationi satis efficaciter obsisti solet. Purgantibus valentioribus caute abstinenceatur, quae cursum humorum rectum extremum versus faciendo, irritationem urethrae retrorsum propius vesicae cervicem ducere, et ita, fluxu ex toto cessante, tumorem testium, luemve ipsam, excitare periclitantur.

3. Diuretica. Horum utilissimum hoc in morbo est nitrum, quod et corpus refrigerat

gerat et urinam movet. Ex aliquo potu mucilaginoso, soluto ex. gr. gummi Arabico, dissolvatur, ut, ipso refrigerante et inflammationem imminuente, vehiculum urethram ab acrimonia urinae defendat.

9. Narcotica. Haec aliquando necessaria fiunt, dolore et tentigine noctu graviter urgentibus, et somnum aegrotanti adimentibus.

4. Applicationes topicae. a. Cataplasmata. Haec fere solum necessaria evadunt, si magnus penis tumor, phymosis, paraphymosis, &c. infestare incipiunt. Rebus ita se habentibus, e saccharo saturni, extracto Goulardi ex aqua soluto, componantur, quae emollientibus praestare videntur.

b. Fomenta. Haec non tantum partes ab immunditia immunes servant, et exulcerationibus externis occurrunt, sed viribus relaxantibus inflammationem urethrae non parum imminuunt. Penis in poculum profundius et tepida repletum in semihoram, aut circiter, bis terve singulis diebus, demittatur. Hoc dolorem tensionemque partibus

† G

laboran-

laborantibus mirum in modum demet, et ut aegrotus urinam facillime excernat saepe faciet.

c. Liquores in urethram immittendi. Dum inflammatio urethrae invalescit, liquores etiam blandissimi in eam injecti, tanta est ejus irritabilitas, signa graviora reddere periclitantur. Quantum igitur morbum intendere possunt liquores refrigerantes et adstringentes in fistulam urinae, ut nonnulli suadent, immissi? Praeterquam quod vim inflammationi addunt, nonne, si supra inflammationis locum ascendunt, virus secum ferre, idque in corpore altius et firmitus insidere cogendo, magnopere nocere possunt? Hoc haud dubie frequenter praestant. Namque usum eorum non tantum tumor testiculorum, sed bubones et lues quam maxime inveterata, non raro subsequuntur. Igitur, si ulli hujusmodi liquores omnino adhibeantur, quam maxime lenes et blandi sint, ut oleum omnis rancoris expers, et urethra, dum immittuntur, ne altius propellantur, supra locum affectum diligenter

genter comprimatur. In locum autem omnium horum, substitui debent liquores emollientes vel mucilaginosi liberaliter epoti, qui quantitatem urinae augent, acrimoniam ejus obtundunt, et urethram materia venera, quae in ea latet, efficacius, quam quilibet liquores in eam immixti, liberare valent. Nonne, denique, fomenta externa inflammationem multo magis, quam ulli liquores interne adhibiti, qui tantum parce in urethram injici possunt, levare consueverunt, et igitur hos nulla ex parte necessarios efficiunt?

d. Regimen antiphlogisticum. Hoc omni morbi tempore summa cum cura adhibeatur. Cibus aegroto talis sit, qualis facile concoquatur, refrigeret, et nulla ex parte stimulet. Potus mucilaginosus sit, nihilque spirituosus fermentativè liquoris contineat. Exercitationem aeger refugiat, quiete fruatur, venere et omnibus, quae libidinem possunt movere, abstineat. Procul absint universa quae stimulo corpus animumve afficiunt.

Si inflammatio testiculi oriatur, ei succurrunt sanguis, magis minusve pro gravitate signorum, liberaliter et per lanceolam et hirudines detractus, cataplasmata e solutione sacchari saturni debili composita, positura horizontalis, emetica. Qua ratione postrema agant ignoro; sed fluxum ex urethra saepe restituant, qui ad tumorem testiculi solvendum non parum confert.

Consilio III. respondent tonica, ut cortex Peruvianus, balneum frigidum, &c. adstringentia, ut alumen, balsamum copaibae liberaliter adhibitum, solutiones vitrioli albi et similium in urethram immissae. Namque hoc tempore, viro ex toto expulso, et omnibus aliis signis praeter stillicidium merum sublatis, nec tonica nocent, nec injectiones adstringentes effectus pravos edunt, saepissime utiles, fere semper innocuae.

Si per morbi decursum in urethra carunculae oriantur, et, reliquis signis sublatis, mancant, praeparatis, quae Anglice *bougies* appel-

appellantur, suppressendae et sanandae. Si compositionem eorum novisse velis, opera chirurgorum ingeniosa aideas.

Hae rationes gonorrhoeae medendi plerumque optime cedunt. Nonnihil tamen mercurii, ne pars viri fuerit absorpta, omni in exemplo debet adhiberi.

Quantum luem spectat, consilium medendi unicum est, actioni viri in systema ulteriori occurrere, idemque extinguere. Quod solum vero hoc praestare potest, id est mercurius formis diversis, et magis minusve liberaliter pro natura signorum, adhibitus.

Cum ulcuscula oriuntur, moris multorum est nulla medicamenta externa iis applicare, sed aperta relinquere, et sanationem eorum per mercurium interne adhibitum moliri. Caeterum, ea ad cicatricem quam celerrime perducere videtur praestare; aperta enim relicta fons viri venerei perpetuus evadunt, unde systema universum magis magisque infici periclitatur. Quae his vero facillime medentur, ea sunt mercurius praecipitatus ruber,

ruber, in pulverem quam maxime subtilem redactus, iis inspersus, et corrosivus sublimatus ex aliquo liquore solutus iis applicatus. Postea linteo, cui aliquantum cujuslibet unguenti communis fuit illitum, tegenda. Hoc modo curata brevi plerumque sanescunt. Unguentum quoque mercuriale fortius idem, quod praeparata modo posita, solet praestare. Quod vero forsitan omnibus e mercurio praeparatis, si ulcusculis velis mederi, longe praestat, est causticum lunare. Usus vero mercurii internus nunquam interea negligendus; namque, ulcusculo orto, metus nunquam deest, ne virus absorptum in systema semet diffundat.

Si bubones vel tumores glandularum inguinalium moveantur, eos discutere, non ad suppurationem perducere, expedit. Etenim suppuratione finiti saepe ulcera sinuosa formant, quae non absque summa difficultate sanantur. Quinetiam, ob viciniam vasorum majorum, eos incidere non semper periculo vacat. Eos autem discutiunt, si hoc fieri potest, cataplasmata, quibus aliquantum sacchari

chari saturni fuit adjunctum; unguentum mercuriale femori interno, infra glandulas inguinales, applicatum, sanguis per hiru-
dines detractus, &c. Licet ad suppurationem perveniant, et multum puris effundant, non curationem morbi huic profusioni ex toto committendum, sed ad mercurium nihilominus semper decurrendum.

Si virus systema ingressum est, et humores pro certo vitiavit, omnis fiducia nostra in mercurio collocanda. Hic in corpus vel per lymphatica cutanea vel per os invehitur. Cum vero in viam medendi priorem procedimus, et unguentum mercuriale adhibemus, quantitatem in corpus devectam pro certo cognoscere non possumus. Igitur vel excretionem salivae nimis copiosam repente reddere, vel nimis parcam movere, periclitamur. Nonnulli quidem mercurium hoc modo assumptum non alvum tam facile movere contendunt. Hoc vero dubium esse videtur. Utrum alvus autem necne solutior reddatur, non multum refert; excretiones enim alvinas fere semper opis
est

est nostrae limitibus iustis per opium circumscribere. Has ob causas, igitur, usus mercurii internus, quam externus, tutior. Praeparatum, quod vulgo adhibendum, est pilulae ex hydrargyro, e melle quam diligentissime extincto, cui tantum micarum panis, quantum crassitudinem ei idoneam possit comparare, fuit adjunctum, compositae. Hae fumantur, donec gingivae aliquantum tumeant et doleant, et sputum modicum excitetur. Hoc nunquam sit copiosissimum. Immodicum enim non morbo citius aut certius medetur, sed vires aegroto convellit, et multis aliis morbis, qui non aliquin accessissent, fundamenta jactit. In usu mercurii, donec omnes morbi notae fuerint sublatae, et aliquamdiu postea, caute tardeque persistetur. Si pilulae votis non respondebunt, ad alia praeparata confugi debet. Alio enim incassum adhibito, aliud morbum saepe depellit. Ulceribus substantibus, et cute deformata, solutio corrosivi sublimati plurimum in morbum posse consuevit.

Quinetiam,

Quinetiam, pilulae Plummeri et Æthiopicae similes in casibus similibus edunt effectus.

Nonnulli quidem ad has confugere dubitant, ne sulphur, in iis conficiendis adhibitum, mercurium reddat inertem. Cum successu vero prospero saepe adhibitas fuisse probe scio.

Si vires aegroto, quod saepe incidit, incipiant convelli, mercurio cortex Peruvianus, et alia tonica, protinus adjungantur, quae tantum absunt, ut actionem mercurii impediant, ut eam, contra, potentiores efficiant; namque tonus corporis certus ad efficaciam mercurii promovendam necessarius esse videtur. Si in hanc medendi viam procedatur, vitabuntur plerumque atrophia, phthisis pulmonalis, hydrops, alique morbi funesti, qui luem inveteratam nimis frequenter excipiunt.

Si quis fiduciam in decoctis sarsaparillae, guaiaci, mezerei, &c. collocet, ad ea potest decurri. Actioni mercurii forsitan auxiliantur. Per se adhibita, hac in regione, mor-

†

H

bum

bum nunquam tollunt. Quod denique votis omnium optime solet respondere est, quam maximam mercurii quantitatem, cum quam minima cujuslibet generis excretionem, in systemate accumulare.

F I N I S.